



Handelsbezeichnung	Schädlingsfrei Careo Konzentrat				
Registernummer	3035-0				
Art der Zubereitung	Wasserlösliches Konzentrat (SL)				
Wirkungstyp	Insektizid				

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Acetamiprid	5	g/l	0,49		IRAC (4A)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
Evergreen Garden Care Österreich GmbH	Franz-Brötner-Straße 11-13 5071 Wals-Siezenheim, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
Evergreen Garden Care Österreich GmbH	Franz-Brötner-Straße 11-13 5071 Wals-Siezenheim, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	05.10.2010
Datum der letzten Änderung	06.04.2025
Antrag auf Erneuerung	30.05.2018
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr. Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1 Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC Topf und Containerpflanzen)	<ul style="list-style-type: none">Weiß Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, Trialeurodes vaporariorum)Dickmaulrüssler (OTIOSP, Otiorhynchus sp.)SchildläuseBlattläuse (1APHIF, Aphididae)Wolf- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas, Haus- und Kleingartenbereich: Büroräume, Balkone, Wohnräume	Ja	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
2	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">• Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, Trialeurodes vaporariorum)• Schildläuse• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)• Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland, Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas, Haus- und Kleingartennbereich: Büroräume, Balkone, Wohnräume	Ja	Nein	Nein	
3	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Thripse	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland, Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas, Haus- und Kleingartennbereich: Büroräume, Balkone, Wohnräume	Ja	Nein	Nein	
4	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none">• Paprika (CPSAN)• Melanzani (Auberginen) (SOLME)• Tomaten (LYPES)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
5	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none">• Melanzani (Auberginen) (SOLME)• Tomaten (LYPES)	• Weiße Fliege (Mottenschildlaus)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
7	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
8	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none">• Apfelwickler (CARPPO, Cydia pomonella)• Schalenwickler (CAPURE, Adoxophyes orana)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
9	Obstbau	<ul style="list-style-type: none">• Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)• Süßkirsche (PRNAV)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
10	Obstbau	<ul style="list-style-type: none">• Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)• Süßkirsche (PRNAV)	• Kirschfruchtfliege (RHAGCE, Rhagoletis cerasi) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
11	Obstbau	• Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
12	Ackerbau	• Kartoffel (SOLTU)	• Kartoffelkäfer	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
13	Zierpflanzenbau	• Buchsbaum (BUXSE)	• Buchsbaumzünsler (DPHNPE, Cydalima perspectalis)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Ja	Nein	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
Gewässergefährdend	Chronisch, Kategorie 2	GHS09	keines	H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	Betroffene Indikationen
EUH208	Enthält 1,2-Benzothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
Schädlich für Nützlinge.
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmu ngsrisiko bergen, ausbringen.
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
Berührung mit der Haut vermeiden. Handschuhe und geeignete Arbeitskle idung (langärmliges Oberteil, lange Hose und festes Schuhwerk) tragen bei der Ausbringung/ Handhabung des Mittels.



Betroffene Indikationen	
Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberfläche ngewässer besteht.	1 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 2 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 7 - Kernobst (3PMFC), 8 - Kernobst (3PMFC), 9 - Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 10 - Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 11 - Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), 12 - Kartoffel (SOLTU), 13 - Buchsbaum (BUXSE)
Schädlich für bestäubende Insekten.	

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode, auch keine zusätzlich en Anwendungen mit anderen, diese(n) Wirkstoff(e) enthaltenden Mitteln.	7 - Kernobst (3PMFC), 8 - Kernobst (3PMFC)
Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanweisung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbesondere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben.	
Behandeln bis zur sichtbaren Benetzung.	
Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Insecticide Resistance Action Committee (IRAC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 4A.	
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.	13 - Buchsbaum (BUXSE)
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzaufwand verträglich ist (Positivliste).	1 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 2 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 13 - Buchsbaum (BUXSE)

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat	Vereinigtes Königreich
Handelsbezeichnung	Bugclear Ultra Vine Weevil Killer
Zulassungsnummer	13522



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr.	1
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	Topf und Containerpflanzen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, Trialeurodes vaporariorum)	
Dickmaulrüssler (OTIOSP, Otiorhynchus sp.)	
Schildläuse	
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas,
Haus- und Kleingartenbereich: Büroräume, Balkone, Wohnräume

HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	ml/l Substrat	Kompost, Erde		100	ml/l Substrat	100 ml/l Substrat (Kompost, Erde) Kompost, Erde

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei oder kurz nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 60

Anwendungsart Gießen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr.	2
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliege (Mottenschildlaus) (TRIAVA, Trialeurodes vaporariorum)	
Schildläuse	
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas,
Haus- und Kleingartenbereich: Büroräume, Balkone, Wohnräume

HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen
0,6 ml/m ² Pflanzenhöhe bis 50 cm	60 ml/m ² Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,9 ml/m ² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90 ml/m ² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1,2 ml/m ² Pflanzenhöhe über 125 cm	120 ml/m ² Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei oder kurz nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung 3

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr.	3
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas, Haus- und Kleingartenbereich: Büroräume, Balkone, Wohnräume
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen
0,6 ml/m ² Pflanzenhöhe bis 50 cm	60 ml/m ² 60 ml/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,9 ml/m ² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90 ml/m ² 90 ml/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1,2 ml/m ² Pflanzenhöhe über 125 cm	120 ml/m ² 120 ml/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei oder kurz nach Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	3
--------------------------------------------------	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	
---------------------------------------------------------	--

Zeitlicher Abstand in Tagen	10
-----------------------------	----

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbauprist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr.	4
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	
Melanzeni (Auberginen) (SOLME)	
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen
0,6 ml/m ² Pflanzenhöhe bis 50 cm	60 ml/m ² (Pflanzengröße bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,9 ml/m ² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90 ml/m ² (Pflanzengröße 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1,2 ml/m ² Pflanzenhöhe über 125 cm	120 ml/m ² (Pflanzengröße über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--------------------------------------------------	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	
---------------------------------------------------------	--

Zeitlicher Abstand in Tagen	10
-----------------------------	----

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	14
---------------------	----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 5

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Melanzani (Auberginen) (SOLME)	
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliege (Mottenschildlaus)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen
0,6 ml/m ² Pflanzenhöhe bis 50 cm	60 ml/m ² (Pflanzengröße bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,9 ml/m ² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90 ml/m ² (Pflanzengröße 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1,2 ml/m ² Pflanzenhöhe über 125 cm	120 ml/m ² (Pflanzengröße über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbauprist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 7
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	ml/m ² /m Kronenhöhe	1,0%		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe
1	ml/m ²	max.		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diese(n) Wirkstoff(e) enthaltenden Mitteln.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr.	8
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Apfelwickler (CARPO, Cydia pomonella)	
Schalenwickler (CAPURE, Adoxophyes orana)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
-------------------	----------------------------------------

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	ml/m ² /m Kronenhöhe	1,0%		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe
1	ml/m ²	max.		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--------------------------------------------------	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	
---------------------------------------------------------	--

Zeitlicher Abstand in Tagen	10
-----------------------------	----

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	14
---------------------	----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diese(n) Wirkstoff(e) enthaltenden Mitteln.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 9
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Süßkirsche (PRNAV)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	ml/m ² /m Kronenhöhe	1,0%		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe
1,5	ml/m ²	max.		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 10
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Süßkirsche (PRNAV)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kirschfruchtfliege (RHAGCE, Rhagoletis cerasi)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	ml/m ² /m Kronenhöhe	2%		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe
1,5	ml/m ²	max.		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 11

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	ml/m ² /m Kronenhöhe	1,0%		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe
1,5	ml/m ²	max.		50	ml/m ² /m Kronenhöhe	50 ml/m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 12
Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kartoffel (SOLTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kartoffelkäfer	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,3 - 0,5 ml/m ²	ml/m ²	0,3 - 0,5 ml/m ²	30	50	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 3035-0

Nr. 13
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Buchsbaum (BUXSE)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Buchsbaumzünsler (DPHNPE, Cydalima perspectalis)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen	Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen
0,6 ml/m ² Pflanzenhöhe bis 50 cm	60 ml/m ² 60 ml/m ² (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,9 ml/m ² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90 ml/m ² 90 ml/m ² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1,2 ml/m ² Pflanzenhöhe über 125 cm	120 ml/m ² 120 ml/m ² (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>