



Handelsbezeichnung	Compo Schädlings-frei plus
Registernummer	3141-901
Art der Zubereitung	Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat) (EC)
Wirkungstyp	Akarizid, Insektizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Pyrethrine	4,59	g/l	0,5		IRAC (3A)
Rapsöl	825,3	g/l	90		IRAC (UN)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
W. Neudorff GmbH KG	An der Mühle 3 31860 Emmerthal, Deutschland

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
Compo Austria GmbH.	Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
Compo Austria GmbH.	Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

Status	genehmigt
Beginn der Zulassung	20.07.2012
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	27.01.2012
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	
Abverkaufsfrist	15.08.2024
Aufbrauchsfrist	15.08.2025

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
2	Gemüsebau	• Kohlrabi (BRSOG)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland	Nein	Nein	Nein	
4	Gemüsebau	• Kopfkohl (3HCAC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland	Nein	Nein	Nein	



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
5	Gemüsebau	• Kopfkohl (3HCAC)	<ul style="list-style-type: none">• Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung• Schmetterlingsraupen Freifressend, Zur Befallsminderung	Freiland		Nein	Nein	Nein
12	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland		Nein	Nein	Nein
13	Gemüsebau	• Porree (Lauch) (ALLPO)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland		Nein	Nein	Nein
14	Gemüsebau	• Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	<ul style="list-style-type: none">• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland		Nein	Nein	Nein
15	Gemüsebau	• Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	<ul style="list-style-type: none">• Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung	Freiland		Nein	Nein	Nein
36	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
38	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
40	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Napschildläuse (1COCCF, Coccidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
42	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
44	Ackerbau	• Kartoffel (SOLTU)	• Kartoffelkäfer (LPTNDE, Leptinotarsa decemlineata)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
45	Gemüsebau	• Kohlrabi (BRSOG)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
46	Gemüsebau	• Kohlrabi (BRSOG)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
47	Gemüsebau	• Kopfkohl (3HCAC) Ausgenommen Kohlrabi	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß § 5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
48	Gemüsebau	• Kopfkohl (3HCAC)	<ul style="list-style-type: none">• Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
49	Gemüsebau	• Hülsengemüse (3LEV)	<ul style="list-style-type: none">• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
50	Gemüsebau	• Hülsengemüse (3LEV)	<ul style="list-style-type: none">• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
51	Gemüsebau	• Hülsengemüse (3LEV)	<ul style="list-style-type: none">• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Nur bedingt wirksam, Freifressend	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
52	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen	<ul style="list-style-type: none">• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
53	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen	<ul style="list-style-type: none">• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung• Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
54	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen	<ul style="list-style-type: none">• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
55	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	<ul style="list-style-type: none">• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
56	Gemüsebau	• Porree (Lauch) (ALLPO)	<ul style="list-style-type: none">• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
57	Gemüsebau	• Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	<ul style="list-style-type: none">• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
58	Gemüsebau	• Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	<ul style="list-style-type: none">• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung• Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
59	Gemüsebau	• Salate (3LETC)	<ul style="list-style-type: none">• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)• Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütentripsy (Frankliniella occidentalis)• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), Ausgenommen Salat-Wurzelläus (<i>Pemphigus bursarius</i>)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
60	Gemüsebau	• Salate (3LETC)	<ul style="list-style-type: none">• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
61	Gemüsebau	• Salate (3LETC)	<ul style="list-style-type: none">• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)• Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütentripsy (Frankliniella occidentalis)• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), Ausgenommen Salat-Wurzelläus (<i>Pemphigus bursarius</i>)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
62	Gemüsebau	• Salate (3LETC)	<ul style="list-style-type: none">• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
63	Gemüsebau	• Spargel (ASPOF) Ertragsanlagen nach der Ernte, Junganlagen	<ul style="list-style-type: none">• Spargelkäfer (CRIEDU, Crioceris duodecimpunctata)• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung• Spargelhähnchen (CRIEAS, Crioceris asparagi)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß § 5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
64	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Mehlige Apfelblattlaus (<i>Dysaphis plantaginea</i>), Ausgenommen Blutlaus (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Ausgenommen Grüne Zitrus-Blattlaus (<i>Aphis spiraecola</i>), Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
65	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none">Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Ausgenommen Apfelwickler (<i>Cydia pomonella</i>), Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
66	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none">Birnenknospenstecher (ANTHPY, <i>Anthonomus pyri</i>) Zur BefallsminderungRotbrauner Apfelfruchtstecher (COENAQ, <i>Rhynchos aequatus</i>) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
67	Obstbau	• Apfel (MABSD)	<ul style="list-style-type: none">Apfelblütenstecher (ANTHPO, <i>Anthonomus pomorum</i>) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
68	Obstbau	• Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) • Süßkirsche (PRNAV)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
69	Obstbau	• Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) • Süßkirsche (PRNAV)	<ul style="list-style-type: none">Echte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinidae)Kirschkernstecher (ANTHRE, <i>Furcipes rectirostris</i>) Zur BefallsminderungSchmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
71	Obstbau	• Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
72	Obstbau	• Holunder (SAMNI) • Preiselbeeren (VACVI) • Kultur-Heidelbeere (VACCO) • Johannisbeeren (RIBSS)	<ul style="list-style-type: none">Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Ausgenommen Glasflügler (Sesiidae), Zur BefallsminderungEchte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
73	Obstbau	• Himbeeren (RUBID) • Brombeeren (RUBFR)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß § 5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
74	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur BefallsminderungThripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
75	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Zur BefallsminderungThripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
78	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Weisse Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
79	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
80	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Napfschildläuse (1COCCF, Coccoidea) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
81	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Spinmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
82	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (Pemphigus bursarius)Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)Weisse Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Ja	Nein	
126	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC) Jungpflanzen	<ul style="list-style-type: none">Käfer (1COLEO, Coleoptera) Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur BefallsminderungSchmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartennbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
127	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	<ul style="list-style-type: none">Spinmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung	Freiland	Nein	Nein	Nein	



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
128	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
129	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
130	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
131	Gemüsebau	• Schalotten (ALLAS) • Zwiebel (ALLCE) • Knoblauch (ALLSA)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
132	Gemüsebau	• Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC) Ausgenommen Kohlrabi • Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC) • Rote Rüben (3BERC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae) • Zikaden (1CICDF, Cicadellidae) • Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Karotten-Wurzellaus (Dysaphis crataegi)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
133	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (Pemphigus bursarius) • Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae) • Zikaden (1CICDF, Cicadellidae) • Thripse (1THRIF, Thripidae) Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
134	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut	• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
135	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Nutzung als frisches Kraut	• Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera) Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
Gewässergefährdend	Chronisch, Kategorie 2	GHS09	keines	H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH208	Enthält raffiniertes Pyrethrum Konzentrat (CAS-Nr. 89997-63-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

	Betroffene Indikationen		
Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -gerätedelen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:	2 - Kohlrabi (BRSOG), 4 - Kopfkohl (3HCAC), 5 - Kopfkohl (3HCAC), 12 - Gurke (CUMSA), 13 - Porree (Lauch) (ALLPO), 14 - Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC), 15 - Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC), 127 - Gurke (CUMSA)		
Abstandsauflagen			
Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.



Betroffene Indikationen	
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.	
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.	
Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächen gewässer besteht.	
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.	
Schädlich für Nützlinge.	

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise



Betroffene Indikationen	
<p>Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit Wirkstoffen aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.</p>	
<p>Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.</p>	
<p>Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten.</p>	
<p>Schäden an der Kulturpflanze möglich.</p>	
<p>Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.</p>	
<p>In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzaufwand verträglich oder unverträglich ist.</p>	
<p>Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Insecticide Resistance Action Committee (IRAC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): nicht gelistet; Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 3A.</p>	



Betroffene Indikationen	
In der Gebrauchsanweisung ist über die Anwendungsbedingungen, unter denen mit einer entsprechenden Wirksamkeit zu rechnen ist, umfassend zu informieren.	51 - Hülsengemüse (3LEVC)

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 2
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrabi (BRSOG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha			600	l/ha	600 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 4
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kopfkohl (3HCAC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 5

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kopfkohl (3HCAC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Käfer (1COLEO, Coleoptera)	Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung
Schmetterlingsraupen	Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha			600	l/ha	600 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbauprist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 12
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm		600	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm
9	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm		900	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
12	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm		1.200	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 13
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Porree (Lauch) (ALLPO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 14
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 15

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Käfer (1COLEO, Coleoptera)	Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbauprist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 36

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
1,4	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,8	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 38
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
1,8	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
2,4	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 40
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Büro-, Wohnräume, Wintergarten

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
1,8	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
2,4	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 42
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 44
Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kartoffel (SOLTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kartoffelkäfer (LPTNDE, Leptinotarsa decemlineata)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,8	ml/m ²		40	60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 45
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrabi (BRSOG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 46
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrabi (BRSOG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr.	47
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kopfkohl (3HCAC)	Ausgenommen Kohlrabi

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 48
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kopfkohl (3HCAC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Käfer (1COLEO, Coleoptera)	Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 49
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Hülsenfrüchte (3LEVC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 50
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Hülsengemüse (3LEVC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²		Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²		Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²		Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 51
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Hülsengemüse (3LEVC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Nur bedingt wirksam, Freifressend

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.
In der Gebrauchsanweisung ist über die Anwendungsbedingungen, unter denen mit einer entsprechenden Wirksamkeit zu rechnen ist, umfassend zu informieren.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 52
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	Jungpflanzen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2
Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 53
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	Jungpflanzen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Freifressend, Zur Befallsminderung
Käfer (1COLEO, Coleoptera)	Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 54
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	Jungpflanzen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 55
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 56
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Porree (Lauch) (ALLPO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 57
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 58
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattgemüse Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) (3CHEC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Freifressend, Zur Befallsminderung
Käfer (1COLEO, Coleoptera)	Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr.	59
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Weisse Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	Ausgenommen Kalifornischer Blütenthalips (Frankliniella occidentalis)
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (Pemphigus bursarius)

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen		41		Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	3
---------------------	---

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr.	60
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen		41		Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	3
---------------------	---

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr.	61
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Weisse Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	Ausgenommen Kalifornischer Blütenthalips (Frankliniella occidentalis)
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Ausgenommen Salat-Blattlaus (Nasonovia ribisnigri), Ausgenommen Salat-Wurzelaus (Pemphigus bursarius)

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen		41		Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	7
---------------------	---

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 62
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengrenzbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen		41		Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr.	63
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Spargel (ASPOF)	Ertragsanlagen nach der Ernte, Junganlagen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spargelkäfer (CRIEDU, Crioceris duodecimpunctata)	
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Freifressend, Zur Befallsminderung
Spargelhähnchen (CRIEAS, Crioceris asparagi)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbauprist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 64
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Ausgenommen Mehlige Apfelblattlaus (<i>Dysaphis plantaginea</i>), Ausgenommen Blutlaus (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Ausgenommen Grüne Zitrus-Blattlaus (<i>Aphis spiraecola</i>), Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	ml/m ² /m Kronenhöhe			50	ml/m ² /m Kronenhöhe	
1,5	ml/m ²	max.		150	ml/m ²	max.

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 65
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Ausgenommen Apfelwickler (Cydia pomonella), Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,4	ml/m ² /m Kronenhöhe			50	ml/m ² /m Kronenhöhe	
1,1	ml/m ²	max.		150	ml/m ²	max.

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 66
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Birnenknospenstecher (ANTHPY, Anthonomus pyri)	Zur Befallsminderung
Rotbrauner Apfelfruchtstecher (COENAQ, Rhynchites aequatus)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,4	ml/m ² /m Kronenhöhe			50	ml/m ² /m Kronenhöhe	
1,1	ml/m ²	max.		150	ml/m ²	max.

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 67
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Apfel (MABSD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Apfelblütenstecher (ANTHPO, Anthonomus pomorum)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,2	ml/m ² /m Kronenhöhe			50	ml/m ² /m Kronenhöhe	
0,7	ml/m ²	max.		150	ml/m ²	max.

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadi um	von BBCH-Stadi um	bis BBCH-Stadi um	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen				
Vor der Blüte		59		Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 3 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 68
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Süßkirsche (PRNAV)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,4	ml/m ² /m Kronenhöhe			50	ml/m ² /m Kronenhöhe	
1,1	ml/m ²	max.		150	ml/m ²	max.

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 69
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Süßkirsche (PRNAV)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinidae)	
Kirschkernstecher (ANTHRE, Furcipes rectirostris)	Zur Befallsminderung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,4	ml/m ² /m Kronenhöhe			50	ml/m ² /m Kronenhöhe	
1,1	ml/m ²	max.		150	ml/m ²	max.

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 71
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	ml/m ²			100	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in 2 dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der 2 Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 72
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Holunder (SAMNI)	
Preiselbeeren (VACVI)	
Kultur-Heidelbeere (VACCO)	
Johannisbeeren (RIBSS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Ausgenommen Glasflügler (Sesiidae), Zur Befallsminderung
Echte Blattwespen (1TENTF, Tenthredinidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	ml/m ²			100	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 73

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Himbeeren (RUBID)	
Brombeeren (RUBFR)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	ml/m ²			100	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 74
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Zur Befallsminderung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 75
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Zur Befallsminderung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (Frankliniella occidentalis)
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 78

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
1,4	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,8	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich. Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen. In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.
--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 79

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
1,8	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
2,4	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 80
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Napfschildläuse (1COCCF, Coccidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
1,8	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
2,4	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 81
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Schäden an der Kulturpflanze möglich.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr.	82
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Nutzung als frisches Kraut

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Ausgenommen Salat-Blattlaus (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (<i>Pemphigus bursarius</i>)
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Weisse Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Ja
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadi um	von	bis BBCH-Stadi um	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7 mind.
-----------------------------	---------

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	7
---------------------	---

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 126

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	Jungpflanzen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Käfer (1COLEO, Coleoptera)	Ausgenommen Rüsselkäfer (Curculionidae), Zur Befallsminderung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 5 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 127
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
6	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm		600	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm
9	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm		900	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
12	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm		1.200	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräte(teile)n, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsaufgaben	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
	gemäß Indikation	Spritzen	5	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen	5	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräte(teile) (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 128

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 129

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengebiet: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 130

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengrenzbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	60	ml/m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	
0,9	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	90	ml/m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	
1,2	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	120	ml/m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 131
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schalotten (ALLAS)	
Zwiebel (ALLCE)	
Knoblauch (ALLSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 132

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC)	Ausgenommen Kohlrabi
Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC)	
Rote Rüben (3BERC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Ausgenommen Karotten-Wurzellaus (<i>Dysaphis crataegi</i>)

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 133

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Nutzung als frisches Kraut

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Ausgenommen Salat-Blattlaus (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), Ausgenommen Salat-Wurzellaus (<i>Pemphigus bursarius</i>)
Weisse Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	Ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbauprist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 134

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Nutzung als frisches Kraut

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Schädlings-frei plus, 3141-901

Nr. 135

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Nutzung als frisches Kraut

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schmetterlingsraupen (1LEPIO, Lepidoptera)	Ausgenommen Wickler (Tortricidae), Freifressend, Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartengrenzbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,6	ml/m ²			60	ml/m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 mind.

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>