



Handelsbezeichnung	Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF
Registernummer	2711-908
Art der Zubereitung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkungstyp	Fungizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Azoxystrobin	250	g/l	23,23		FRAC (11)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
Syngenta Agro GmbH. Zweigniederlassung Österreich	Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1 1230 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
Compo Austria GmbH.	Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
Compo Austria GmbH.	Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

Status	genehmigt
Beginn der Zulassung	27.01.2014
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	
Abverkaufsfrist	26.10.2024
Aufbrauchsfrist	26.10.2025

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Ackerbau	• Ackerbohne (VICFM)	• Fleckenkrankheit (BOTRFA, Botrytis fabae)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
2	Ackerbau	• Ackerbohne (VICFM)	• Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
3	Ackerbau	• Ackerbohne (VICFM)	• Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
4	Ackerbau	• Futtererbse (PIBSA)	• Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
5	Ackerbau	• Gräser (3GRAC) Saatzguterzeugung	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
6	Ackerbau	• Gräser (3GRAC) Saatzguterzeugung	• Pilzliche Blattfleckenkrankheiten	Freiland	Nein	Ja	Nein		
7	Ackerbau	• Kartoffel (SOLTU)	• Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
8	Ackerbau	• Lupine-Arten (3LUPC)	• Colletotrichum	Freiland	Nein	Ja	Nein		
9	Ackerbau	• Phacelia (PHCTA) Saatzguterzeugung	• Botrytis-Arten	Freiland	Nein	Ja	Nein		
10	Ackerbau	• Raps (3OILC)	• Rapsschwärze (Alternaria) (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
11	Ackerbau	• Raps (3OILC)	• Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
12	Ackerbau	• Mais (ZEAMX) Saatzmais	• Helminthosporium-Arten (HELMSP, Helminthosporium sp.)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
13	Ackerbau	• Tabak (NIOTA)	• Blauschimmel (PEROTA, Peronospora hyoscyami, vormalig P. tabacina)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
14	Ackerbau	• Tabak (NIOTA)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
15	Ackerbau	• Zuckerrübe (BEAVA) • Futterrübe (BEAVC)	• Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
16	Gemüsebau	• Melanzani (Auberginen) (SOLME)	• Dürffleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria solani)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
17	Gemüsebau	• Melanzani (Auberginen) (SOLME)	• Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
18	Gemüsebau	• Rote Rübe (BEAVD) Einschließlich gelber und weißer Formen	• Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
19	Gemüsebau	• Blattkohle (3LFBC)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
20	Gemüsebau	• Blattkohle (3LFBC)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
21	Gemüsebau	• Blattkohle (3LFBC)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
22	Gemüsebau	• Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	• Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
23	Gemüsebau	• Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	• Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
24	Gemüsebau	• Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	• Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
25	Gemüsebau	• Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	• Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
26	Gemüsebau	• Blumenkohl (3FBRC)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
27	Gemüsebau	• Blumenkohl (3FBRC)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
28	Gemüsebau	• Blumenkohl (3FBRC)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
29	Gemüsebau	• Buschbohne (PHSVN)	• Brennfleckenkrankheit	Freiland	Nein	Ja	Nein		
30	Gemüsebau	• Buschbohne (PHSVN)	• Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
31	Gemüsebau	• Chicoree (CICSS)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Rost (PUCCHI, Puccinia cichorii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
32	Gemüsebau	• Chinakohl (BRSPK)	• Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTEBA, Alternaria brassicae) • Falscher Mehltau	Freiland	Nein	Ja	Nein		
33	Gemüsebau	• Ackerbohne (VICFM) • Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)	• Brennfleckenkrankheit	Freiland	Nein	Ja	Nein		
34	Gemüsebau	• Ackerbohne (VICFM) • Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)	• Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
35	Gemüsebau	• Ackerbohne (VICFM) • Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
36	Gemüsebau	• Echte Kamille (MATCH) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis	• Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
37	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	• Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
38	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	• Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi, Phoma pinodella, Mycosphaerella pinodes)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
39	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	• Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
40	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	• Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
41	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	• Botrytis (Botrytis cinerea)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
42	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Frisch	• Pilzliche Blattfleckenreger • Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporaceae) • Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
43	Gemüsebau	• Gemeine Ringelblume (CLDOF) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis	• Echte Mehltupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
44	Gemüsebau	• Gemüfefenchel (FOEVA)	• Pilzliche Blattfleckenereger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
45	Gemüsebau	• Paprika (CPSAN)	• Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
46	Gemüsebau	• Paprika (CPSAN)	• Phytophthora capsici (PHYTCP, Phytophthora capsici)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
47	Gemüsebau	• Paprika (CPSAN)	• Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTESP, Alternaria Spp.)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
48	Gemüsebau	• Paprika (CPSAN)	• Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
49	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
50	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
51	Gemüsebau	• Johanniskraut-Arten (HYPSS) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis	• Johanniskrautwelke (Colletotrichum sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
52	Gemüsebau	• Knoblauch (ALLSA)	• Falscher Mehltau (Peronospora destructor)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
53	Gemüsebau	• Knoblauch (ALLSA)	• Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
54	Gemüsebau	• Knoblauch (ALLSA)	• Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
55	Gemüsebau	• Knoblauch (ALLSA)	• Rost (PUCCAL, Puccinia allii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
56	Gemüsebau	• Knollensellerie (APUGR)	• Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola) • Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
57	Gemüsebau	• Knollensellerie (APUGR) Nutzung als Bundsellerie	• Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola) • Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
58	Gemüsebau	• Kohlrabi (BRSOG)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) • Pilzliche Blattfleckenereger • Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	Freiland	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
59	Gemüsebau	• Kohlrabi (BRSG)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) • Pilzliche Blattfleckenenerreger • Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
60	Gemüsebau	• Kohlrübe (Steckrübe) (BRUNA)	• Pilzliche Blattfleckenenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
61	Gemüsebau	• Weißkraut (BRSG) • Rotkraut (BRSG) • Spitzkohl (BRSON) • Wirsingkohl (BRSG)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
62	Gemüsebau	• Weißkraut (BRSG) • Rotkraut (BRSG) • Spitzkohl (BRSON) • Wirsingkohl (BRSG)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
63	Gemüsebau	• Weißkraut (BRSG) • Rotkraut (BRSG) • Spitzkohl (BRSON) • Wirsingkohl (BRSG)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
64	Gemüsebau	• Kürbis-Hybriden (CUHY) Mit genießbarer Schale	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
65	Gemüsebau	• Kürbis-Hybriden (CUHY) Mit genießbarer Schale	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
66	Gemüsebau	• Kren (ARWLA)	• Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
67	Gemüsebau	• Kren (ARWLA)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
68	Gemüsebau	• Kren (ARWLA)	• Pilzliche Blattfleckenkrankheiten (ALTERP, Alternaria raphani)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
69	Gemüsebau	• Melonen (CUMME)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
70	Gemüsebau	• Melonen (CUMME)	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
71	Gemüsebau	• Minze-Arten (3MINC) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis	• Pfefferminzen-Rost (PUCCME, Puccinia menthae)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
72	Gemüsebau	• Karotten (DAUCS)	• Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
73	Gemüsebau	• Karotten (DAUCS)	• Möhrenschrätze (Alternaria dauci)	Freiland	Nein	Nein	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
74	Gemüsebau	• Karotten (DAUCS)	• Blattfleckenerkrankung (CERCCA, Cercospora carotae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
75	Gemüsebau	• Pastinaken (PAVSA)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
76	Gemüsebau	• Patisson (CUUPM) Mit genießbarer Schale	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
77	Gemüsebau	• Patisson (CUUPM) Mit genießbarer Schale	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
78	Gemüsebau	• Porree (Lauch) (ALLPO)	• Rost (PUCCAL, Puccinia allii) • Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
79	Gemüsebau	• Porree (Lauch) (ALLPO)	• Papierfleckenerkrankung (PHYTPO, Phytophthora porri)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
80	Gemüsebau	• Porree (Lauch) (ALLPO)	• Blattfleckenerkrankung (Cladosporium allii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
81	Gemüsebau	• Radieschen (RAPSR) • Rettich (RAPSN)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) • Pilzliche Blattfleckenerreger • Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
82	Gemüsebau	• Radieschen (RAPSR) • Rettich (RAPSN)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida) • Pilzliche Blattfleckenerreger • Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
83	Gemüsebau	• Kohlsprossen (BRSOF)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
84	Gemüsebau	• Kohlsprossen (BRSOF)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
85	Gemüsebau	• Kohlsprossen (BRSOF)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
86	Gemüsebau	• Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.)	• Falsche Mehltaupilze (Peronospora spp.) • Pilzliche Blattfleckenerreger • Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
87	Gemüsebau	• Salate (3LETC) • Endivie (Escariol) (CICEN)	• Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
88	Gemüsebau	• Salate (3LETC) • Endivie (Escariol) (CICEN)	• Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
89	Gemüsebau	• Salate (3LETC) • Endivie (Escariol) (CICEN)	• Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
90	Gemüsebau	• Schalotten (ALLAS)	• Falscher Mehltau (Peronospora destructor)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
91	Gemüsebau	• Schalotten (ALLAS)	• Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
92	Gemüsebau	• Schnittlauch (ALLSC) Bulbenanzucht	• Rost (PUCCAL, Puccinia allii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
93	Gemüsebau	• Schnittmangold (BEAVV) • Stielmangold (BEAVF)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
94	Gemüsebau	• Schwarzwurzel (SCVHI)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
95	Gemüsebau	• Spargel (ASPOF)	• Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
96	Gemüsebau	• Spargel (ASPOF)	• Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
97	Gemüsebau	• Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
98	Gemüsebau	• Zwiebel (ALLCE) Nutzung als Trockenzwiebel	• Falscher Mehltau (Peronospora destructor)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
99	Gemüsebau	• Zwiebel (ALLCE) Nutzung als Trockenzwiebel	• Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
100	Gemüsebau	• Zwiebel (ALLCE) Nutzung als Trockenzwiebel	• Blattfleckkrankheit (Cladosporium allii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
101	Gemüsebau	• Spitzwegerich (PLALA) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis	• Echte Mehltapilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
102	Gemüsebau	• Stangenbohne (PHSVX)	• Bohnenrost (UROMAP, Uromyces appendiculatus) • Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum) • Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
103	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
104	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
105	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
106	Gemüsebau	• Topinambur (HELTU)	• Rost (PUCCHE, Puccinia helianthi)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
107	Gemüsebau	• Wurzelpetersilie (PARCT)	• Blattfleckkrankheit (SEPTPE, Septoria petroselini)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
108	Gemüsebau	• Wurzelsichorie (CICIS)	• Rost (PUCCHI, Puccinia cichorii)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
109	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG)	• Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	Freiland	Nein	Nein	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
110	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG)	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis) • Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
111	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG)	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
112	Gemüsebau	• Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC) Nutzung als Bundzwiebel	• Falscher Mehltau (Peronospora destructor) • Rost (PUCCAL, Puccinia allii) • Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii) • Purpurfleckenkrankheit (ALTEPO, Alternaria porri)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
113	Gemüsebau	• Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC) Nutzung als Bundzwiebel	• Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
114	Hopfenbau	• Hopfen (HUMLU)	• Falscher Mehltau (PSPEHU, Pseudoperonospora humuli) Sekundärinfektion	Freiland	Nein	Nein	Nein		
115	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
116	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
117	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
118	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein		
119	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
120	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
121	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Echter Mehltau	Freiland	Nein	Ja	Nein		
122	Ackerbau	• Kartoffel (SOLTU)	• Wurzeltöterkrankheit (Rhizoctonia solani)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
123	Ackerbau	• Kartoffel (SOLTU)	• Colletotrichum-Welke (COLLCC, Colletotrichum coccodes) Nur zur Befallsminderung	Freiland	Nein	Nein	Nein		
124	Gemüsebau	• Buschbohne (PHSVN)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
125	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
126	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG)	• Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
127	Gemüsebau	• Blumenkohl (3FBRC)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
128	Gemüsebau	• Blumenkohl (3FBRC)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
129	Gemüsebau	• Blumenkohl (3FBRC)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
130	Gemüsebau	• Blattkohl (3LFBC)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
131	Gemüsebau	• Blattkohl (3LFBC)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
132	Gemüsebau	• Blattkohl (3LFBC)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
133	Gemüsebau	• Weißkraut (BRSOL) • Rotkraut (BRSOR) • Spitzkohl (BRSON) • Wirsingkohl (BRSOS)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
134	Gemüsebau	• Weißkraut (BRSOL) • Rotkraut (BRSOR) • Spitzkohl (BRSON) • Wirsingkohl (BRSOS)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
135	Gemüsebau	• Weißkraut (BRSOL) • Rotkraut (BRSOR) • Spitzkohl (BRSON) • Wirsingkohl (BRSOS)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
136	Gemüsebau	• Kohlsprossen (BRSOF)	• Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
137	Gemüsebau	• Kohlsprossen (BRSOF)	• Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
138	Gemüsebau	• Kohlsprossen (BRSOF)	• Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
139	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
140	Ackerbau	• Kartoffel (SOLTU)	• Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
141	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
142	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
143	Gemüsebau	• Tomaten (LYPES)	• Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
144	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
145	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) • Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
146	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
147	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	• Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
148	Gemüsebau	• Salate (3LETC) • Endivie (Escariol) (CICEN)	• Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
149	Gemüsebau	• Salate (3LETC) • Endivie (Escariol) (CICEN)	• Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
150	Gemüsebau	• Karotten (DAUCS)	• Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
151	Gemüsebau	• Karotten (DAUCS)	• Möhrenschränke (Alternaria dauci)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
152	Gemüsebau	• Karotten (DAUCS)	• Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
153	Gemüsebau	• Spargel (ASPOF)	• Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
154	Gemüsebau	• Spargel (ASPOF)	• Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
155	Gemüsebau	• Artischocke (CYUSC)	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
156	Gemüsebau	• Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC) Nutzung als Baby-leaf-Salat	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
157	Gemüsebau	• Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA) Nutzung als Baby-leaf-Salat • Stielmus (BRSRE) Nutzung als Baby-leaf-Salat • Radieschen (RAPSR) Nutzung als Baby-leaf-Salat • Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR) Nutzung als Baby-leaf-Salat • Rettich (RAPSN) Nutzung als Baby-leaf-Salat	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
158	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX) Nutzung als Baby-leaf-Salat	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
159	Gemüsebau	• Salat-Arten Nutzung als Baby-leaf-Salat	• Pilzliche Blattfleckenerreger	Freiland	Nein	Ja	Nein		
160	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
161	Gemüsebau	• Linse (LENCU) Saatguterzeugung	• Botrytis-Arten	Freiland	Nein	Ja	Nein		
162	Ackerbau	• Buchweizen (FAGES) Saatguterzeugung	• Botrytis-Arten	Freiland	Nein	Ja	Nein		
163	Ackerbau	• Ölerrettich (RAPSO) Saatguterzeugung	• Botrytis-Arten	Freiland	Nein	Ja	Nein		
164	Gemüsebau	• Kresse (LEPSA) Saatguterzeugung	• Botrytis-Arten	Freiland	Nein	Ja	Nein		
165	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Saatguterzeugung	• Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
166	Gemüsebau	• Kräuter (3HERC) Saatguterzeugung	• Pilzliche Blattfleckenkrankheiten	Freiland	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Historische Version vom: 03.05.2024

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
167	Zierpflanz enbau	<ul style="list-style-type: none">• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">• Pilzliche Blattfleckenerreger	Haus- und Kleingarte nbereich: Freiland	Ja	Ja	Nein		
168	Zierpflanz enbau	<ul style="list-style-type: none">• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">• Echter Mehltau (ERYSGT)	Haus- und Kleingarte nbereich: Freiland	Ja	Ja	Nein		



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
Akute Toxizität	Kategorie 4	GHS07	Achtung	H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gewässergefährdend	Chronisch, Kategorie 1	GHS09	Achtung	H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P261	Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.	
P264	Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.	
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.	
P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ...anrufen.	
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH208	Enthält 1,2-benzisothiazol-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen



Betroffene Indikationen	
<p>Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:</p>	<p>1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 4 - Futtererbse (PIBSA), 5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 7 - Kartoffel (SOLTU), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 10 - Raps (3OILC), 11 - Raps (3OILC), 12 - Mais (ZEMAX), 13 - Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenchel (FOEVA), 49 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSON), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 71 - Minze-Arten (3MINC), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 82 - Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), 83 - Kohlsprossen (BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen (BRSOF), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVV), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelschwiebel (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 114 - Hopfen (HUMLU), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - Kartoffel (SOLTU), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 155 - Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 161 - Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrrettich (RAPSO), 164 - Kresse (LEPSA), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - Kräuter (3HERC)</p>



Betroffene Indikationen				
Abstandsauflagen	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklassifizierung
	Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
	Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
	Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
	Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
	Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
	Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
	Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
	Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
	Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
	Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
	Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
	Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
	Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
	Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
	Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
	Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
	Kohlsprossen, Topinampur	Spritzen	15	R
	Kohlsprossen, Topinampur	Spritzen	10	5
	Kohlsprossen, Topinampur	Spritzen	5	7
	Kohlsprossen, Topinampur	Spritzen	10	9
	Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
	Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
	Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
	Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9
Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. - geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:				
Abstandsauflagen	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklassifizierung
	gemäß Indikation	Spritzen	20	90 %

114 - Hopfen (HUMLU)



Betroffene Indikationen			
Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:		115 - Erdbeeren (FRAAN)	
Abstandsauflagen			
Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftmind
gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsegabel	5	Regelabstand
gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsegabel	5	50 %
gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsegabel	1	75 %
gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsegabel	1	90 %
Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:		83 - Kohlsprossen (BR5OF), 84 - Kohlsprossen (BR5OF), 85 - Kohlsprossen (BR5OF), 106 - Topinambur (HELTU)	
Abstandsauflagen			
Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungskla
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	50 %
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	75 %
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	90 %
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	Regelabstand

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen	
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.	
Abbauprodukte können ins Grundwasser gelangen.	
Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.	52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC)
Pflanzenhöhe bis 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.	102 - Stangenbohne (PHSVX)
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.	
Pflanzenhöhe über 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.	102 - Stangenbohne (PHSVX)
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.	



Betroffene Indikationen	
Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.	4 - Futtererbse (PIBSA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 32 - Chinakohl (BRSPK), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSON), Wirsingkohl (BRSON), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSON), Wirsingkohl (BRSON), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSON), Wirsingkohl (BRSON), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC)
Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberfläche ngewässer besteht.	126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle (3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSON), Wirsingkohl (BRSON), 134 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSON), Wirsingkohl (BRSON), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSON), Wirsingkohl (BRSON), 136 - Kohlsprossen (BRSON), 137 - Kohlsprossen (BRSON), 138 - Kohlsprossen (BRSON), 140 - Kartoffel (SOLTU), 144 - Gurke (CUMSA), 146 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 150 - Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel (ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)
Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.	1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 12 - Mais (ZEAMX), 13 - Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüfefenchel (FOEVA), 49 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSON), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSON), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 71 - Minze-Arten (3MINC), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 82 - Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSON), 101 - Spitzwegerich (PLALA), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelsellerie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 155 - Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSON), Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSON), Stielmus (BRSON), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 161 - Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPS), 164 - Kresse (LEPSA)
Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteeile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungskategorie entsprechende n reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.	
Der vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (Bezugsgröße ist der Regelabstand bzw. der Mindestabstand der jeweils anzuwendenden Abdriftminderungskategorie) kann um 25% reduziert werden, wenn sich vor dem Gewässer in Bereich der Applikationsfläche eine durchgehend dicht belaubte Randvegetation befindet. Diese hat eine Mindestbreite von 1 m und überragt die zu behandelnde Raumkultur (oder bei Flächenkulturen die Höhe der Spritzdüsen) mindestens um 1 m.	



Betroffene Indikationen
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanla gen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

				Betroffene Indikationen
In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen festgelegt:				114 - Hopfen (HUMLU)
Aufwandsmengen				
Menge von	Menge bis	Einheit	Stadium	
0.25	0.75	l/ha	Von Stadium 31 (10% der Gerüsthöhe erreicht) bis Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)	
0.75	1.6	l/ha	Ab Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)	

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
12 - Mais (ZEAMX)



Betroffene Indikationen	
	<p>1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 4 - Futtererbse (PIBSA), 5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 7 - Kartoffel (SOLTU), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 10 - Raps (3OILC), 11 - Raps (3OILC), 13 - Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 16 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüfefenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - Paprika (CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 49 - Gurke (CUMSA), 50 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSGO), 59 - Kohlrabi (BRSGO), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRUNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSL), Wirsingkohl (BRSON), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSL), Wirsingkohl (BRSON), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSL), Wirsingkohl (BRSON), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen (CUMME), 70 - Melonen (CUMME), 71 - Minze-Arten (3MINC), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 81 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 82 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 83 - Kohlsprossen (BRSGO), 84 - Kohlsprossen (BRSGO), 85 - Kohlsprossen (BRSGO), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSGO), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzweigerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 103 - Tomaten (LYPES), 104 - Tomaten (LYPES), 105 - Tomaten (LYPES), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelpetersilie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 110 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 114 - Hopfen (HUMLU), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - Kartoffel (SOLTU), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle (3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSL), Wirsingkohl (BRSON), 134 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSL), Wirsingkohl (BRSON), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSL), Wirsingkohl (BRSON), 136 - Kohlsprossen (BRSGO), 137 - Kohlsprossen (BRSGO), 138 - Kohlsprossen (BRSGO), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 140 - Kartoffel (SOLTU), 141 - Tomaten (LYPES), 142 - Tomaten (LYPES), 143 - Tomaten (LYPES), 144 - Gurke (CUMSA), 145 - Gurke (CUMSA), 146 - Gurke (CUMSA), 147 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 150 - Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel (ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 155 - Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRUNA), Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSGO), Stielmus (BRSGO), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 161 - Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Örettich (RAPSO), 164 - Kresse (LEPSA), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - Kräuter (3HERC), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)</p>
Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.	
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).	117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Jahr und Kultur, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die Wirkstoffe aus der Gruppe der Strobilurine enthalten.	114 - Hopfen (HUMLU)



Betroffene Indikationen	
Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.	93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF)
Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.	7 - Kartoffel (SOLTU), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - Kartoffel (SOLTU), 140 - Kartoffel (SOLTU)
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.	1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 13 - Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 16 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - Ackerbohne (VICFM), 34 - Ackerbohne (VICFM), 35 - Ackerbohne (VICFM), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - Paprika (CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen (CUMME), 70 - Melonen (CUMME), 71 - Minze-Arten (3MINC), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 81 - Radieschen (RAPSRR), Rettich (RAPSRR), 82 - Radieschen (RAPSRR), Rettich (RAPSRR), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelpetersilie (CICIS), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 116 - Erdbeeren (FRAAN), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 155 - Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPSRR), Rettich (RAPSRR), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 161 - Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPSRR), 164 - Kresse (LEPSA), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - Kräuter (3HERC), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)



Betroffene Indikationen	
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.	<p>1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 4 - Futtererbse (PIBSA), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 12 - Mais (ZEAMX), 13 - Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 16 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüfefenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - Paprika (CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 49 - Gurke (CUMSA), 50 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen (CUMME), 70 - Melonen (CUMME), 71 - Minze-Arten (3MINC), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 82 - Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), 83 - Kohlsprossen (BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen (BRSOF), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LET), 88 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LET), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LET), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzweigerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 103 - Tomaten (LYPES), 104 - Tomaten (LYPES), 105 - Tomaten (LYPES), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelschicorie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 110 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 116 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle (3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 134 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 136 - Kohlsprossen (BRSOF), 137 - Kohlsprossen (BRSOF), 138 - Kohlsprossen (BRSOF), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 141 - Tomaten (LYPES), 142 - Tomaten (LYPES), 143 - Tomaten (LYPES), 144 - Gurke (CUMSA), 145 - Gurke (CUMSA), 146 - Gurke (CUMSA), 147 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LET), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LET), 155 - Artischocke (CYUSC), 161 - Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPS), 164 - Kresse (LEPSA), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)</p>
Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.	<p>5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 10 - Raps (3OILC), 11 - Raps (3OILC), 81 - Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LET), 150 - Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel (ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBR), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPS), Rettich (RAPS), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - Kräuter (3HERC)</p>



Betroffene Indikationen

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

7 - Kartoffel (SOLTU), 16 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 42 - Kräuter (3HERC), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsesfenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - Paprika (CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 49 - Gurke (CUMSA), 50 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen (CUMME), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 81 - Radieschen (RAPSRR), Rettich (RAPSRR), 82 - Radieschen (RAPSRR), Rettich (RAPSRR), 83 - Kohlsprossen (BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen (BRSOF), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 103 - Tomaten (LYPES), 104 - Tomaten (LYPES), 105 - Tomaten (LYPES), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelschicorie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 114 - Hopfen (HUMLU), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 116 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - Kartoffel (SOLTU), 124 - Buschbohne (PHSVN), 126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle (3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 134 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 136 - Kohlsprossen (BRSOF), 137 - Kohlsprossen (BRSOF), 138 - Kohlsprossen (BRSOF), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 140 - Kartoffel (SOLTU), 141 - Tomaten (LYPES), 142 - Tomaten (LYPES), 143 - Tomaten (LYPES), 144 - Gurke (CUMSA), 145 - Gurke (CUMSA), 146 - Gurke (CUMSA), 147 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 150 - Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel (ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 155 - Artischocke (CYUSC), 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Fungicide Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus (FRAC GRUPPE): 11.

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedstaat	Deutschland
Handelsbezeichnung	Ortiva
Zulassungsnummer	024560-00



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 1

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ackerbohne (VICFM)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Fleckenkrankheit (BOTRFA, Botrytis fabae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 35

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 2

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ackerbohne (VICFM)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 35

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 3

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ackerbohne (VICFM)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 35

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 4

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Futtererbse (PIBSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	51	Erste Blütenknospen sichtbar	75	50% der Hülsen haben art-/sortentypische Länge erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 35

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 5

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gräser (3GRAC)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
--

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 6

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gräser (3GRAC)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenkrankheiten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
--

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 7

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kartoffel (SOLTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	31	Beginn Bestandesschluss: 10% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich	91	Beginn der Laubblattvergilbung bzw. Laubblattaufhellung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 8

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Lupine-Arten (3LUPC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Colletotrichum	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 35

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 9

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Phacelia (PHCTA)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Botrytis-Arten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 10

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Raps (3OILC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rapsschwärze (Alternaria) (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	51	Infloreszenzknospen sichtbar	69	Ende der Blüte

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 11

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Raps (3OILC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	61	ca. 10% der Blüten am Haupttrieb offen	69	Ende der Blüte

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 12

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Mais (ZEAMX)	Saatmais

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Helminthosporium-Arten (HELMSP, Helminthosporium sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	500	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 21

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 13

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tabak (NIOTA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blauschimmel (PEROTA, Peronospora hyoscyami, vormalig P. tabacina)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	900	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	33	30% des arttypischen max. Längen- bzw. Rosettenwachstums erreicht, 3-Knotenstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 14

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tabak (NIOTA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	900	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	64		Etwa 40% der Blüten geöffnet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 15

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zuckerrübe (BEAVA)	
Futterrübe (BEAVC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	39	Bestandesschluss: über 90% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich	49	Rübenkörper hat erntefähige Größe erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 35

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 16

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Melanzani (Auberginen) (SOLME)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria solani)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 17

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Melanzani (Auberginen) (SOLME)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 18

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Rote Rübe (BEAVD)	Einschließlich gelber und weißer Formen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 42

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 19

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattkohle (3LFBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 20

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattkohle (3LFBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 21

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattkohle (3LFBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 22

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 23

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 24

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 25

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 26

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blumenkohle (3FBRC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 27

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blumenkohle (3FBRC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 28

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blumenkohle (3FBRC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 29

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Buschbohne (PHSVN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Brennfleckenkrankheit	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 30

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Buschbohne (PHSVN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 31

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Chicoree (CICSS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Rost (PUCCHI, Puccinia cichorii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen mindestens 21

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 32

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Chinakohl (BRSPK)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTEBA, Alternaria brassicae)	
Falscher Mehltau	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 33

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ackerbohne (VICFM)	
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Brennfleckenkrankheit	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	21	1. Seitenspross sichtbar		
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 34

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ackerbohne (VICFM)	
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 35

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ackerbohne (VICFM)	
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 36

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Echte Kamille (MATCH)	Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 37

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	30	Beginn des Längenwachstums		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 38

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi, Phoma pinodella, Mycosphaerella pinodes)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	30	Beginn des Längenwachstums		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 39

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PEROV, Peronospora viciae f. sp. pisi)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	30	Beginn des Längenwachstums		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 40

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	30	Beginn des Längenwachstums		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 41

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Botrytis (Botrytis cinerea)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	30	Beginn des Längenwachstums		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 42
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Frisch

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	
Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporaceae)	
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 43
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemeine Ringelblume (CLDOF)	Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 44

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsefenchel (FOEVA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		400	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 45

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 46

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Phytophthora capsici (PHYTCP, Phytophthora capsici)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 47

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTESP, Alternaria Spp.)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 48

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 49
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 50
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 51
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Johanniskraut-Arten (HYPSS)	Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Johanniskrautwelke (Colletotrichum sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	12	2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 35
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 52

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Knoblauch (ALLSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (Peronospora destructor)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 53

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Knoblauch (ALLSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 54

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Knoblauch (ALLSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 55

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Knoblauch (ALLSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAL, Puccinia allii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt deutlich sichtbar	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 56

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Knollensellerie (APUGR)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)	
Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 57
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Knollensellerie (APUGR)	Nutzung als Bundsellerie

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)	
Rost (PUCCAP, Puccinia apii)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 58
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrabi (BRSOG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	
Pilzliche Blattfleckenerreger	
Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		400	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 59
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrabi (BRSOG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	
Pilzliche Blattfleckenerreger	
Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		400	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	13	3. Laubblatt entfaltet		
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 60

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 42

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 61
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weißkraut (BRSOL)	
Rotkraut (BRSOR)	
Spitzkohl (BRSON)	
Wirsingkohl (BRSOS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 62
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weißkraut (BRSOL)	
Rotkraut (BRSOR)	
Spitzkohl (BRSON)	
Wirsingkohl (BRSOS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 63

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weißkraut (BRSOL)	
Rotkraut (BRSOR)	
Spitzkohl (BRSON)	
Wirsingkohl (BRSOS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 64

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kürbis-Hybriden (CUUHY)	Mit genießbarer Schale

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.		
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 65

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kürbis-Hybriden (CUUHY)	Mit genießbarer Schale

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 66

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kren (ARWLA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 28

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 67

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kren (ARWLA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 28

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 68

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kren (ARWLA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenkrankheiten (ALTERP, Alternaria raphani)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 28

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 69

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Melonen (CUMME)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.		
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 70

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Melonen (CUMME)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 71

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Minze-Arten (3MINC)	Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pfefferminzen-Rost (PUCCME, Puccinia menthae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 72

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 73

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Möhrenschwärze (Alternaria dauci)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 74

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 75

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Pastinaken (PAVSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 10

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 76

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Patisson (CUUPM)	Mit genießbarer Schale

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 77

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Patisson (CUUPM)	Mit genießbarer Schale

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium von	bis BBCH-Stadium bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 78

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Porree (Lauch) (ALLPO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAL, Puccinia allii)	
Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 21

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 79

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Porree (Lauch) (ALLPO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Papierfleckenkrankheit (PHYTPO, Phytophthora porri)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 21

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 80

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Porree (Lauch) (ALLPO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 21

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 81

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Radieschen (RAPSR)	
Rettich (RAPSN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	
Pilzliche Blattfleckenerreger	
Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		400	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	10	Keimblätter voll entfaltet; Vegetationspunkt oder Laubblattansatz sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 21

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 82

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Radieschen (RAPSR)	
Rettich (RAPSN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	
Pilzliche Blattfleckenerreger	
Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienst hinweis				
	10	Keimblätter voll entfaltet; Vegetationspunkt oder Laubblattansatz sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 83

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlsprossen (BRSOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:



Abstandsauflagen	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungskla
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	50 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	75 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	90 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	Regelabstand

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 84

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlsprossen (BRSOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelnbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:



Abstandsauflagen	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungskla
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	50 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	75 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	90 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	Regelabstand

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 85

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlsprossen (BRSOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:



Abstandsauflagen	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungskla
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	50 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	75 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	90 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	Regelabstand

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 86

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falsche Mehltaupilze (Peronospora spp.)	
Pilzliche Blattfleckenerreger	
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 87

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	
Endivie (Escariol) (CICEN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	41	Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 88

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	
Endivie (Escariol) (CICEN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	41	Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten Blätter entfalten sich nicht mehr	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 89

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	
Endivie (Escariol) (CICEN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rhizoctonia solani (RHIZO, Rhizoctonia solani)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		300	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
		18		8. Laubblatt entfaltet

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 90

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schalotten (ALLAS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 91

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schalotten (ALLAS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 92

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schnittlauch (ALLSC)	Bulbenanzucht

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAL, Puccinia allii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 21

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 93

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schnittmangold (BEAVV)	
Stielmangold (BEAVF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha			600	l/ha	Max. 600 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 21

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 94

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schwarzwurzel (SCVHI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 10

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 95

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Spargel (ASPOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha			600	l/ha	600 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 96

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Spargel (ASPOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha			600	l/ha	600 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 97

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSSR)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 98
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zwiebel (ALLCE)	Nutzung als Trockenzwiebel

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (Peronospora destructor)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 99

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zwiebel (ALLCE)	Nutzung als Trockenzwiebel

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 100

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zwiebel (ALLCE)	Nutzung als Trockenzwiebel

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 101

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Spitzwegerich (PLALA)	Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als teeähnliches Erzeugnis

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 102

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stangenbohne (PHSVX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Bohnenrost (UROMAP, Uromyces appendiculatus)	
Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)	
Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	l/ha	600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Pflanzenhöhe bis 50 cm
1,5	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	900	l/ha	900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
2	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.200	l/ha	1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Pflanzenhöhe bis 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Pflanzenhöhe über 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 103
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm		600	l/ha	Max. 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm		900	l/ha	Max. 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm		1.200	l/ha	Max. 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 104
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm		600	l/ha	Max 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm		900	l/ha	Max. 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm		1.200	l/ha	Max. 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 105
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm		600	l/ha	Max. 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm		900	l/ha	Max. 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm		1.200	l/ha	Max. 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 106

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Topinambur (HELTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCHE, Puccinia helianthi)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	13	3-Blattstadium		
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 42

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:



Abstandsauflagen				
	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungskla
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	50 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	75 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	90 %
	Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	Regelabstand

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 107

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Wurzelpetersilie (PARCT)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (SEPTPE, Septoria petroselini)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 10

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 108

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Wurzelzichorie (CICIS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCHI, Puccinia cichorii)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 109

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 110

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	
Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 111

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 112
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC)	Nutzung als Bundzwiebel

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (Peronospora destructor)	
Rost (PUCCAL, Puccinia allii)	
Blattfleckkrankheit (Cladosporium allii)	
Purpurfleckkrankheit (ALTEPO, Alternaria porri)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 113
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC)	Nutzung als Bundzwiebel

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha			1.000	l/ha	Maximal 1000 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3-Blattstadium		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 114

Einsatzgebiet Hopfenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Hopfen (HUMLU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPEHU, Pseudoperonospora humuli)	Sekundärinfektion

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,6	l/ha	max.		3.000	l/ha	3000 l/ha (Berechnungsbasis) Berechnungsbasis

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	31	10% der Gerüsthöhe erreicht	89	Pflückreife: "Dolden" geschlossen; Lupuline goldgelb gefärbt; Aroma ausgeprägt

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 28

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9



Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklass
gemäß Indikation	Spritzen	20	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandsmengen festgelegt:

Aufwandsmengen

Menge von	Menge bis	Einheit	Stadium
0.25	0.75	l/ha	Von Stadium 31 (10% der Gerüsthöhe erreicht) bis Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)
0.75	1.6	l/ha	Ab Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Jahr und Kultur, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die Wirkstoffe aus der Gruppe der Strobilurine enthalten.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 115

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha			2.000	l/ha	2000 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	56	Achse des Blütenstandes beginnt sich zu strecken	67	Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:



Abstandsauflagen	Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftmind
	gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel	5	Regelabstand
	gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel	5	50 %
	gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel	1	75 %
	gemäß Indikation	Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel	1	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 116

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum)	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha			2.000	l/ha	2000 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	56	Achse des Blütenstandes beginnt sich zu strecken	67	Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 117
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	1.200	l/ha	
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	600	1.200	l/ha	
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	600	1.200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadi um	von bis BBCH-Stadi um	bis
Von 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub aber noch grün			
Bei Befallsgefahr			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 118
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,5	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	1.200	l/ha	
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	600	1.200	l/ha	
1	l/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	600	1.200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	bis BBCH-Stadium
Von 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub aber noch grün		
Bei Befallsgefahr		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 119

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	1.200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 120

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Unter Glas

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	1.200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 121

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	1.200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 122
Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kartoffel (SOLTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Wurzeltöterkrankheit (Rhizoctonia solani)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
3	l/ha		150	200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Reihenbehandlung beim Legen, Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 123
Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kartoffel (SOLTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Colletotrichum-Welke (COLLCC, Colletotrichum coccodes)	Nur zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
3	l/ha		150	200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Reihenbehandlung beim Legen, Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 124

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Buschbohne (PHSVN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross sichtbar		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 125

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	30	Beginn des Längenwachstums		
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 126

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 127
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blumenkohl (3FBRC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelnbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 128

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blumenkohle (3FBRC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 129

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blumenkohle (3FBRC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 130

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattkohle (3LFBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 131

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattkohle (3LFBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 132

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Blattkohle (3LFBC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 133
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weißkraut (BRSOL)	
Rotkraut (BRSOR)	
Spitzkohl (BRSON)	
Wirsingkohl (BRSOS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 134
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weißkraut (BRSOL)	
Rotkraut (BRSOR)	
Spitzkohl (BRSON)	
Wirsingkohl (BRSOS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 135
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weißkraut (BRSOL)	
Rotkraut (BRSOR)	
Spitzkohl (BRSON)	
Wirsingkohl (BRSOS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 136

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlsprossen (BRSOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 137
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlsprossen (BRSOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 138

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlsprossen (BRSOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	41	Beginn der Seitenknospenbildung bzw. Beginn der Blumenbildung: Vegetation skegelbreite größer als 1 cm	49	Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 139

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	bis BBCH-Stadium
Von 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub aber noch grün		
Bei Befallsgefahr		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 140

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kartoffel (SOLTU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	31	Beginn Bestandesschluss: 10% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich	91	Beginn der Laubblattvergilbung bzw. Laubblattaufhellung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 141

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 142
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 143

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 144
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		3	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 145
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	
Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 146

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		3	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 147

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	21	1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar	89	Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 3

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 148
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	
Endivie (Escariol) (CICEN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 14
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 149

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salate (3LETC)	
Endivie (Escariol) (CICEN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 150

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet	49	art-/sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 151

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Möhrenschwärze (Alternaria dauci)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet	49	art-/sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 152

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²		2	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet	49	art-/sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 14

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 153

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Spargel (ASPOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²			6	l/100 m ²	6 l/100 m ²

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 154

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Spargel (ASPOF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²			6	l/100 m ²	6 l/100 m ²

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 155
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Artischocke (CYUSC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
0,75	l/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	400	600	l/ha	
1	l/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	400	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 156

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC)	Nutzung als Baby-leaf-Salat

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 157
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA)	Nutzung als Baby-leaf-Salat
Stielmus (BRSRE)	Nutzung als Baby-leaf-Salat
Radieschen (RAPSR)	Nutzung als Baby-leaf-Salat
Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR)	Nutzung als Baby-leaf-Salat
Rettich (RAPSN)	Nutzung als Baby-leaf-Salat

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenreger	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 158

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	Nutzung als Baby-leaf-Salat

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienst hinweis				
	13	3. Laubblatt mit Stipeln und Ranke (oder 3. Ranke) entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 159

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Salat-Arten	Nutzung als Baby-leaf-Salat

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenerreger	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	13	3. Laubblatt entfaltet		
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen 7

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 160

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4,8	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
7,2	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
9,6	ml/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsgefahr	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet	91	Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub aber noch grün

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 161

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Linse (LENCU)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Botrytis-Arten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 162

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Buchweizen (FAGES)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Botrytis-Arten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 163

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Ölrettich (RAPSO)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Botrytis-Arten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 164

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kresse (LEPSA)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Botrytis-Arten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 165

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13		3. Laubblatt entfaltet	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
--

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 166

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	Saatguterzeugung

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenkrankheiten	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1	l/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abstand in m
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	R
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	5	5
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	7
Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps	Spritzen	1	9
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	R
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	5
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	7
Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	3	9
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	5
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	1	9
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	5	R
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	5
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	7
Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe bis 50 cm)	Spritzen	1	9
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	15	R
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	5
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	5	7
Kohlsprossen, Topinambur	Spritzen	10	9
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	20	R
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	15	5
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	10	7
Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm)	Spritzen	5	9

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
--

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
--

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 167

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pilzliche Blattfleckenreger	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²	(Pflanzenhöhe bis 50 cm)	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen

Wartefrist in Tagen

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908

Nr. 168

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSGT)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Ja

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10	ml/100 m ²	(Pflanzenhöhe bis 50 cm)	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	13	3. Laubblatt entfaltet		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen

Wartefrist in Tagen

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist (Positivliste).
Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebspezifischen Bedingungen prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>